

# Transmisión y síntomas

## TRANSMISIÓN AL SER HUMANO

El roedor actúa como reservorio del virus hanta, liberándolo a través de la orina, las heces y saliva. La principal forma de contagio hacia los humanos ocurre por vía respiratoria al inhalar gotas frescas o secas que se desprenden de las deposiciones del ratón. Sin embargo, también puede transmitirse por:

- Contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados (tocar ratones vivos o muertos con las manos descubiertas; contacto directo de heridas con ratones o su orina, saliva o heces; consumo de alimentos contaminados).
- Tocar cualquier objeto donde haya sido depositado el virus (herramientas, muebles, ropa) y luego tocar la nariz, ojos o boca.
- Ser mordido por un ratón infectado.

## SÍNTOMAS Y SIGNOS



Fiebre alta.



Dolor de cabeza.



Dolores abdominales.



Dificultad respiratoria (casos agudos).



Escalofríos.



Dolor de cuerpo (osteomuscular).



Náuseas y vómitos.



### IMPORTANTE

En caso de exposición al riesgo (últimas 6 semanas) y presentar la sintomatología mencionada, acuda al servicio de salud más cercano. En el contexto laboral de la Ley N° 16.744 y del D.S. N° 109, se debe consultar al centro de atención de MutuaL de Seguridad.